

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 26 DEL 21 SETTEMBRE 2018

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI
prossimi 5 gg.

Vicenza e pedemontana	venerdì 21 pom/sera	sabato 22 mattina	sabato 22 pom/sera	domenica 23 mattina	domenica 23 pom/sera	lunedì 24	martedì 25
stato del cielo							
temperatura	max 27/29 °C	min 16/18 °C max 23/25 °C		min 14/16 °C max 22/24 °C			
precipitazioni	Assenti	Locali anche a carattere di rovescio/temporale		Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
probabilità precipitazioni	0%	30%		40%	0%	0%	0%
attendibilità previsione		Buona		Buona	Buona	Discreta	Discreta

Bollettino ARPAV
21/09 h 13.00

Andamento meteo: Bel tempo e ancora più caldo della settimana precedente con temperature medie massime di circa 27,5-28,5°C e minime di 17,5-18,5°C. (rispetto al venticinquennio precedente questi valori sono superiori di ben 4-4,5°C!). I due episodi temporaleschi transitati nottetempo sabato e lunedì u.s. hanno prodotto ovunque delle piogge da 5 a 20 mm ma in più di qualche località, nel settore dei Lessini e sul versante ovest dei Berici, si sono scaricati veri e propri acquazzoni come a Lonigo (55,8 mm caduti in totale) che fortunatamente non sono stati accompagnati da eventi calamitosi.

Stato fenologico e culturale: In tutti i comprensori è in corso la **fase di invaiatura** (da 10 a 50% dei frutti colorati sulle cv. precoci). Ovunque le condizioni vegeto-produttive degli impianti sono ottimali.

Stato parassitario: Mosca – Catture di adulti in flessione sulla settimana precedente (anche negli impianti non trattati) ma entità di popolazione ancora su livelli di guardia. In pedemontana la media per trappola/settimana è stata di 8 individui mentre nei Berici-Lessini è stata di 7 con picchi di 21 e 24 rispettivamente. Sulle drupe, finora e ovunque, non sono stati rilevati danni degni di rilievo mentre l'entità di punture e uova/larve è ancora contenuta. Il pericolo di un attacco tardivo è tuttavia probabile e potrebbe anche essere favorito dal mutamento delle condizioni meteo previsto per i prossimi giorni.

Cimice asiatica – attualmente è l'insetto più presente negli oliveti di tutte le zone. Qua e là, dove non è stato eseguito alcun insetticida a tutta chioma, sono state rilevate vere e proprie pullulazioni in cui sono presenti tutti gli stadi dell'insetto.

Indirizzi di difesa: In tutti i comprensori è necessario garantire un'adeguata protezione insetticida per il prossimo periodo! Chi impiega prodotti larvicidi-adulticidi come il Dimetoato o l'Acetamidrid o l'Imidacloprid deve reintervenire a distanza di un paio di settimane da quello precedente. I BIO e coloro che impiegano insetticidi solo adulticidi di contatto, invece, devono ripristinare la copertura alla scadenza del periodo di efficacia del trattamento precedente o a seguito di piogge dilavanti.

Attenzione: Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in etichetta del prodotto da impiegare e le specifiche di impiego delle Linee tecniche di difesa integrata regionali. Soprattutto rispettare il numero massimo di applicazioni consentite in un anno (Dimetoato 2, Acetamidrid e Imidacloprid 1 con neonicotinoidi) e il periodo di sicurezza (Dimetoato 28gg, Acetamidrid 21gg, Imidacloprid 28 gg e Deltametrina 7gg).

Nota: In attesa dell'uscita dell'apposito decreto ai sensi del Reg CE 783/2018, si comunica che l'Imidacloprid è stato revocato dall'uso in campo aperto e non sarà più utilizzabile nel prossimo anno.

SC e MP



Leccino -alta collina Berici (SC)



Leccino -Pedemontana (MP)



Rasara -bassa collina Berici (SC)



Frantoio -Pedemontana (MP)



Mosca delle olive (MP)



Cimice asiatica in nutrizione (SC)